


7. LuCE tüdőrákról szóló jelentés

A tüdőrákos betegek ellátási folyamatával és preferenciáival kapcsolatos kihívások Európában

Diagnosztikai folyamat

Időintervallumok a diagnosztikai folyamat során.

Pirossal: Azok aránya (%-ban), akik több mint 1 hónapot vártak



Mi szükséges a korábbi diagnosztizáláshoz?



64,0%
Szűrővizsgálatok



39,3%
Az alapellátást nyújtó orvosok tüdőrák-oktatása




37,3%
A várakozási idő lerövidítése




35,1%
A lakosság tájékoztatása, felvilágosítása a tüdőrákról


Prioritások a diagnosztikai folyamat javításában



A várakozási időt csökkentő, gyorsított szolgáltatások



Kapcsolattartó biztosítása az egészségügyi ellátó csoport részéről



Ütemterv és egyértelmű tájékoztatás nyújtása

Hogyan javítható az orvosokkal folytatott kommunikáció?

51,0% - Világos terv a következő lépésekre vonatkozóan

46,7% - Empátia és érzékenység

40,4% - Az üzenet egyértelműsége

Prioritások a diagnózistól a kezelésig terjedő időszakban

80,1% - A mellékhatásokról és a szövődmények kockázatának csökkentéséről szóló felvilágosítás

73,4% - Az orvosi kezelési terv elérhetősége

CSELEKVÉSRE ÖSZTÖNZÉS



- Gyorsított beutalási folyamatok alkalmazása a tüdőrákgyanus betegek diagnózisa és kezelése közötti idő csökkentése érdekében
- Célzott szűrővizsgálatok kidolgozása a tüdőrák korábbi diagnosztizálásának elősegítése érdekében
- Több információ biztosítása a tüdőrák által érintett emberek számára a közös döntéshozatal lehetővé tétele és életminőségük javítása érdekében

MÓDSZERTAN

A válaszok 47 kérdésből álló felmérésen alapulnak (2021. 03. 05. – 2021. 10. 07.; n=991).
A felmérést a WHO európai régiójában tüdőrákkal diagnosztizált személyek tölthették ki.
A teljes jelentés itt érhető el: www.lungcancereurope.eu

Kapcsolatfelvétel