

7. keuhkosityöpää koskeva LuCE-raportti

Euroopassa keuhkosityöpää sairastavien henkilöiden hoitopolulla kokemat haasteet ja mieltymykset

Tuki hoitopolulla

35,4%

Tunnisti, että heidän yleisiä tarpeitaan ei huomioitu riittävästi

Osa-alueet, joita terveydenhuollon ammattilaiset eivät käsittele riittävästi:



52,5%
EMOTIONAALINEN



39,7%
FYYSINEN



31,3%
SOSIAALINEN

Mitä on vaikeinta hallita hoitopolulla?



47,5%
Ahdistuneisuus
ennen leikkausta

Leikkaus


44,9%
Kipu



45,8%
Heikko olo/väsymys (fatiikki)

Sädehoito

29,8%
Stressi ja ahdistus
sädehoidon aikana



Farmakoterapia

72,0%
Heikko olo/väsymys
(fatiikki)

33,6%
Pahoinvointi/
oksentelu

Prioriteetit
hoidon aikana ja
sen jälkeen

Ohjeet
komplikaatoriskien
vähentämiseksi

Tuki hättävaiikutusten
hallintaan (erityisesti
kivunhallinta)

Lähetä muille terveydenhuollon
ammattilaisille (62,2%)

Tiedonsaanti itsehoidosta (58,8%)

Lääkärin ja hoitohenkilökunnan
saavutettavuuden parantaminen
(43,7%)



totesi, että
terveydenhuoltotiimien olisi
kerrottava tukipalveluista
ennen hoidon aloittamista

Miten viestintää voidaan parantaa?



44,1%
Pääsy
syöpäsairaanhoitajan
vastaanotolle



43,9%
Pidemmät
lääkärikäynnit

TOIMINTA-EHDOTUKSET



• Otetaan käyttöön nopeat läheteet diagnoosin ja hoidon välisen ajan lyhentämiseksi henkilöiden osalta, joilla epäillään keuhkosityöpää

• Kehitetään kohdennettuja seulontaohjelmia keuhkosityövän varhaisdiagnoosin helpottamiseksi

• Annetaan keuhkosityöpään sairastuneille enemmän tietoa, jotta he voivat osallistua päätöksentekoon ja parantaa elämänlaatuaan

TOTEUTUS

Vastaukset perustuvat 47 kysymyksen kyselyyn (05/03/2021 - 07/10/2021; n=991). Kysely oli avoin WHO:n Euroopan alueella keuhkosityöpädiagnoosin saaneille henkilöille. Koko raportti löytyy täältä: www.lungcancereurope.eu

Ota yhteyttä