

Connaissance du cancer du poumon

En collaboration en France avec :

patients
EN RÉSEAU

Connaissance des facteurs de risque

**82,8%**
Antécédents
de tabagisme**34,8%**
Exposition
à l'amiante**42,5%**
Exposition au
tabagisme passif**34,4%**
Antécédents familiaux**38,5%**
Pollution**21,5%**
Exposition aux
rayonnements

Connaissances relatives au dépistage

Seulement **40,6%** des personnes
connaissaient le dépistage du
cancer du poumon**44,9%** Ils ne savaient pas s'il existait
un programme de dépistage du
cancer du poumon dans leur pays

Connaissances relatives aux symptômes

Seuls deux
symptômes
étaient connus
par plus de 50 %**72,5%**
Toux
persistante**52,6%**
Souffle court,
essoufflementSept symptômes
n'étaient connus
que par moins
de 15 %Sueurs nocturnes ; douleur osseuse ;
fièvre ; dysphagie ; déformation des doigts ;
obstruction de la veine cave supérieure
(SVCO) ; ganglions/bosses/gonflementsRetard de l'avis
médical en raison de...**46,5%**la non reconnaissance
des symptômes du
cancer du poumon**42,9%**l'attribution à tort des
symptômes à d'autres
maladies

Connaissances relatives à la maladie

29,7%
n'avaient pas un bon niveau
de connaissance de la maladie**24,2%**
ne comprenaient pas bien
le diagnostic de la maladie**22,2%**
ne savaient pas si la tumeur était
« positive » à l'un des marqueurs

Manque de connaissances relatives au traitement et aux soins

**46,9%**
Essais cliniques**45,1%**
Soins palliatifs**43,8%**
Biomarqueurs**28,6%**
Radiothérapie

APPEL À L'ACTION



- Sensibiliser au cancer du poumon et au dépistage précoce, et soutenir les efforts de réduction des risques
- Permettre la prise de décision partagée afin d'aider à améliorer la qualité de vie

MÉTHODOLOGIE

Réponses basées sur une enquête en ligne auto-remplie (du 24 mai au 7 juillet 2024) auprès de 2 040 participants (1 432 personnes atteintes d'un cancer du poumon et 608 soignants) de 34 pays de la Région européenne de l'OMS. Le rapport complet peut être consulté ici : www.lungcancereurope.eu