

10-й звіт LuCE щодо раку легенів

Рак легенів та психічне здоров'я:

Досвід європейців, які
постраждали від раку легенів

2025



Lung Cancer Europe

Досвід підтримки під час лікування раку легенів

У співпраці в Україні з: **афіна**
жінки проти раку

відчували, що не здатні впоратися
з проблемами у своєму житті

45,19%

44,53%

не відчували, що
достатньо підготовлені до
емоційних наслідків

Підтримка від близьких



94,08%

отримали підтримку
від близьких



82,51%

були задоволені
цією підтримкою



67,43%

підтримка від близьких була
найціннішою складовою від
моменту встановлення діагнозу



Втім



65,54%

вважали, що близькі не
повністю розуміли, через
що вони проходили



41,09%

не завжди мали кого-небудь,
хто допоможе за потреби



26,45%

не ділилися своїми
переживаннями з близькими

Підтримка від медичної команди



50,53%

їм не пропонували підтримку
з питань психічного здоров'я



41,34%

вважали, що їхня медична
команда не надавала належної
емоційної підтримки



65,88%

не були поінформовані
про пацієнтські організації



39,44%

мали емоційні труднощі,
але не повідомляли про них

Запропоновані заходи
для покращення
психічного здоров'я



49,38%

хотіли більше
медичної інформації

43,90%

потребували більше підтримки
в усуненні побічних ефектів

ЗАКЛИК ДО ДІЙ



- Системи охорони здоров'я та особи, відповідальні за прийняття рішень, мають визнати підтримку психічного здоров'я важливою частиною лікування раку легенів.
- Медичні працівники мають надавати чітку інформацію та сприяти тому, щоб люди могли краще контролювати своє захворювання та психічне здоров'я.

Методологія

Відповіді ґрунтуються на онлайн-опитуванні, заповненому самостійно (28 травня – 6 липня 2025 року), за участю 2 204 респондентів (1 709 людей із раком легенів та 495 піклувальників) із 31 країни Європейського регіону ВООЗ.

